

HIV/AIDS වළකීම

ඔබට ශ්‍රී ලංකාව තුළ වෙනසක් ඇති කළ හැක



Make a
difference

HIV/AIDS

HIV - මානව ප්‍රතිශක්ති උගනා වසිරසය

Human Immunodeficiency Virus

AIDS - නතුකරගත් ප්‍රතිශක්ති උගනා
සහලක්ෂණය

**Acquired Immunodeficiency
Syndromes**



HIV/AIDS

HIV ශරීරය ඇතුළට ඇතුළු වූ පසු **HIV** ආසාදිතයෙකු බවට පත් වේ **HIV+VE**



- **HIV** ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය හීන කරයි
- **HIV** ඇඟට ඇතුළු වී අවුරුදු 8 - 10 යන තෙක් වුව ද රෝග ලක්ෂණ නො පෙන්නිය හැකි ය.
- **HIV** ආසාදිතයකු රෝගී තත්ත්වයකට පත් වන අවධිය **AIDS** යනුවෙන් හඳුන්වයි
- නමුත් මෙම කාලය තුළදී ද මොවුන්ගෙන් තවත් අයෙකුට **HIV** ආසාදනය විය හැකි ය.

මුහුණ බලා HIV ආසාදිතයන් හඳුනා ගත හැකිද?



NO

How you are going to identify an HIV infected person?



HIV infected lady





Young HIV infected children



Magic Johnson - basketball player





Dr. Kamalika Abeyrathna



Hon Justice Edwin Cameron





HIV infected young girls



HIV පවතින්නේ මිනිසා තුළ පමණය

අධික සාන්ද්‍රණයකින් යුත් තරල වලින් **HIV** බෝවේ.

- ශුක්‍රතරලය
- යෝනි තරලය
- මව්කිරි
- රුධිරය

උඩු සාන්ද්‍රණයකින් යුත් තරල වලින් **HIV** බෝ නොවේ.

- කඳුළු
- මුත්‍රා
- අසුචි
- කෙල
- දහඩිය



HIV Facts



- **HIV** වෙනත් සත්ත්ව ශරීරවල ජීවත් විය නො හැකි ශි **HIV** ජීවනට පැමිණි විට හිරු එළියේ දී විනාශ වේ
- කදුළු, කෙළ, මුත්‍රා, අසූචි ආදියේ ඉතා අඩු සාන්ද්‍රණයකින් **HIV** පවතින හෙයින් ඒවාට රෝගය බෝ කිරීමේ හැකියාවක් නොමැත.
- **HIV** මිනිස් සිරුර තුළට ඇතුළු වීමට නම් ශ්ලේෂ්මල පටල වැනි තුනී පටලයක් තුළින් වැරදීම ගමන් කිරීම අවශ්‍ය ශි

උදා :

යෝනි මාර්ගය, ශිෂ්ණ මුත්‍රාධය, ගුද මාර්ගය, මුඛ කුහරය.

- සාමාන්‍ය සම මත **HIV** ආසාදිත රුධිරය වැටුණු විට සම පසාරු කර ගෙන **HIV** වැරදීමට ගමන් කළ නො හැකි ශි

HIV/AIDS ආසාදනය වන ක්‍රම:



1. **HIV/AIDS** ආසාදනයකු සමඟ පවත්වන අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතාව මඟින් (යෝනි, ගුද හා මුඛ සම්බන්ධතා මඟින්)



2. **HIV** ආසාදිත මවක ගෙන් උපදින දරුවාට රෝගය වැළඳීමට 15-45% ක අවදානමක් ඇත



3. **HIV/AIDS** ආසාදිතයකු ගේ රුධිරය හෝ රුධිර නිෂ්පාදන ශරීරයට ඇතුළු වීමෙන්



AIDS, 90% වඩා බෝ වන්නේ අනාරක්ෂිත ලිංගික සබඳතා මගින්


- මෙය ආසාදිතයකු සමඟ ඇති කර ගත් අනාරක්ෂිත යෝනි, මුඛ හා ගුද ලිංගික සබඳතා මගින් සිදු විය හැකිය.
- **අනාරක්ෂිත ලිංගික සබඳතා යනු**
ලිංගික සබඳතාව පවත්වන දෙදෙනා අතර ලිංගික තරල හුවමාරුවක් සිදු වීමයි.
- **ආරක්ෂිත ලිංගික සබඳතා යනු**
ලිංගික තරල හුවමාරුවක් සිදු නොවන ලිංගික සබඳතාවයන්ය.





HIV/AIDS ආසාදිතයකු ගේ රුධිරය හෝ රුධිර නිෂ්පාදන ශරීරයට ඇතුළු වීමෙන්.....

- ආසාදිතයකු භාවිත කළ ජීවාණුහරණය නො කළ ඉඳිකටු, සිරිංප් භාවිත කිරීමෙන්



බිලේඩ් තල හවුලේ භාවිතා නොකල යුතුය

- එක් අයෙකු රුචුල කැපීමේ දී සම සිදුරු වී එහි තැවරුණු රුධිරය; එම අවස්ථාවේ දී ම වෙනත් කෙනෙකු රුචුල කපන විට ඔහුගේ තුවාල වූ සම තුළින් ඇතුළු වීමේ සම්භාවිතාව ඉතා අල්පය.
- මෙසේ බිලේඩ් තලයකින් **AIDS** වැලඳී ඇති අයෙකු මෙතෙක් වාර්තා වී නොමැත.
- **HIV** ආසාදනය බෝවීමේ සම්භාවිතාවය ඉතා අඩු වුවත් සංගමාල **B** සහ **C** යන රෝග හවුලේ බිලේඩ් තල භාවිතයෙන් වැලඳීමට ඉඩ ඇත.

ආසාදිත මව ගෙන් දරුවාට HIV ව්‍යාප්ත වීම

HIV ආසාදිත මවක් ගැබ් ගත හොත් ඇය ගෙන් එම වයිරසය දරුවාට යා හැකි ය

1. ගර්භිණී කාලය තුළ දී
2. දරු ප්‍රසූතියේ දී
3. මවු කිරි දීමෙන්

අවදානම - 25 - 45%



HIV/AIDS ආසාදනය නො වන ක්‍රම



1. ආසාදිතයකු ස්පර්ශයෙන් හෝ අතින් ඇල්ලීමෙන්
2. ආසාදිතයකු සමඟ එකට නෑමෙන්
3. ආසාදිතයකු සමඟ සාමාන්‍ය සිප වැළඳ ගැනීමෙන්
4. ආසාදිතයකු භාවිත කළ පිඟන් කෝප්ප, තුවා, ඇඳුම් හා දුරකථන

ආදිය භාවිතයෙන්

5. ආසාදිතයකු සමඟ සෙල්ලම් කිරීමෙන්
6. ආසාදිතයකු සමඟ එකට විසීමෙන්
7. කැස්ස/කිවිසුම මගින්
8. මදුරුවන්/කෘමීන්/මකුණන් දෂ්ඨ කිරීමෙන්
9. වැසිකිළි අසුන් මගින්



කවුළු සමය (Window period)


- **HIV** ශරීරයට ඇතුළු වූ පසු ශරීරය තුළ ප්‍රතිදේහ ඇති වේ.
- රුධිරයේ ඇති ප්‍රතිදේහ පරීක්ෂා කිරීම මගින් **HIV** ඇති බව දැන ගත හැකි ය.
- රුධිර පරීක්ෂාවට මෙම ප්‍රතිදේහ ඇති බව හසු වන්නේ වසර සය ශරීර ගත වී **සති 2 සිට මාස 3ක්** පමණ කාලයක් ගත වූ පසු ව ශී මේ කාලය කවුළු සමය යැයි හඳුන්වනු ලැබේ.
- කවුළු සමයේ දී **HIV** රුධිර පරීක්ෂාව සෘණ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දැක්වුව ද **HIV** රුධිරයේ ඇති නිසා, මේ කාලය තුළ වසර සය බෝ වන ක්‍රම මගින් වෙනත් කෙනෙකුට ආසාදනය විය හැකි ය.



HIV ආසාදනය හා කවුළු සමය

HIV
ප්‍රතිදේහ

HIV
ආසාදනය



HIV/AIDS

- **AIDS** සඳහා ඇති ඖෂධවලින් **AIDS** තත්වය සම්පූර්ණයෙන් ම සුව නො වන අතර එයින් කළ හැක්කේ ජීවිතයේ ගුණාත්මකභාවය හා ආයු කාලය වැඩි කිරීම පමණි



- එන්නතක් නොමැත



- රෝගය වැඩිපුර ම බෝ වන්නේ අනාරක්ෂිත ලිංගික හැසිරීම් මගිනි.

HIV/AIDS

AIDS තත්ත්වයට වැඩි වශයෙන් නතු වන්නේ ලිංගික සක්‍රීය වයසේ පසුවන්නන් ය. මොවුහු ශ්‍රම බලකායට අයත් වන්නෝ වෙති.



5. දෙමාපියන් **AIDS** නිසා මිය යන විට දරුවන් අනාථභාවයට පත් වේ.




HIV/AIDS බෝ වීම වැළැක්වීමේ ක්‍රම

- අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතා මගින් බෝ වීම වැළැක්වීම සඳහා වගකිව යුතු ලිංගික චර්යා
- **ආරක්ෂිත ලිංගික ක්‍රියා යනු -**
HIV/AIDS ඇතුළු ලිංගාශ්‍රිත රෝග වලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා හා ලිංගික සුවය සඳහා ගනු ලබන ආරක්ෂක ක්‍රියා මාර්ග



ආරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතා



ලිංගික තරල නුවමාරුවක් සිදු නො වීම

(1) අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතා මගින් බෝ වීම වැළැක්වීම සඳහා වගකිව යුතු ලිංගික චර්යා

1. ලිංගික සබඳතා කල් දැමීම

- විවාහය තෙක් ලිංගික සබඳතා පමා කිරීම
- අවදානම් අවස්ථාවල දී සහ සහභාගී / සහකාරීය ගෙන් නාවකාලික ව වෙන් වී සිටින විට



2. වගකීමෙන් ලිංගික සබඳතා පැවැත්විය හැකි

වයසට එළඹුණු පසු වගකීමෙන් යුතුව **අනෝන්‍ය** විශ්වාසයෙන් යුත් එක් සහකරුවෙකු / සහකාරීයකට පමණක් ලිංගික සබඳතා සීමා කිරීම.


3. නිවැරදි ලෙස වගකීමෙන් යුතු ව කොන්ඩමයක් පැළඳීම

තම විශ්වාසවන්ත සහකාර/සහකාරියට පරිබාහිර අය සමඟ ලිංගික සබඳතා පැවත්වුව හොත් සෑම විට ම නිවැරදි ලෙස වගකීමෙන් යුතු ව කොන්ඩමයක් පැළඳීම

ලිංගික සම්බන්ධතාවල දී කොන්ඩම් පැළඳීමේදී වාසි

1. **HIV** ඇතුළු අනෙකුත් ලිංගික සම්ප්‍රේෂණ රෝග හෝ වැලඳීම

2. අනවශ්‍ය ගැබ් ගැනීමක් සිදු නො වීම.





Safety first

කොන්ඩම් පැළඳීමට ඇති ගැටළු

- විශ්වාසය පිලිබඳ ප්‍රශ්න
- සහකරු අකමැති වීම
- තෘප්තිය පිලිබඳ ඇති මිත්‍යා මත



පවුල් සංස්ථාව ශක්තිමත් කිරීම



• වගකීම

• අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය


• අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය





තුරැළි කර ගැනීම, සාමාන්‍ය සිප ගැනීම, කලවා අතර සංසර්ගය හා ස්වයං වින්දනය යන ආසාදනය වීමේ ප්‍රවණතාවයක් නොමැති ආරක්ෂිත ලිංගික ක්‍රියා වේ.

තමා ගේ ජීවිතය පිළිබඳ වගකීම තමා ම ගත යුතු බවත්, ජීවිතයේ සතුට රඳවා ගැනීම සඳහා වගකීමෙන් යුතු ව හැසිරිය යුතුය.



අවදානම් ලිංගික වර්ධය

- කිහිප දෙනකු සමඟ අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැත්වීම හෝ
- කිහිපදෙනකු සමඟ ලිංගික සම්බන්ධතා පවත්වන කෙනකු සමඟ අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැත්වීම
- නිතර නිතර ලිංගික සහකරු හෝ සහකාරිය හෝ මාරු කිරීම්
- ලිංගික වෘත්තියේ යෙදීම
- ලිංගික වෘත්තියේ යෙදෙන්නන් සමඟ අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැත්වීම.

එක් වරක් හෝ අනාරක්ෂිත ලිංගික හැසිරීමක යෙදී ඇත් නම් ලිංගික සම්ප්‍රේෂණ රෝග ඇති වීමේ අවදානමක් ඇත.

(2) රුධිරය මගින් HIV/AIDS බෝ වීම වැළැක්වීම

1 ඉදිකටු, සිරිංප් හෝ අනෙකුත් සම සිදුරු කරන උපකරණ භාවිතයේ දී ඒවායේ ජීවාණුහරණය ගැන සැලකිලිමත් වන්න. මෙ වැනි උපකරණ හවුලේ භාවිත නො කරන්න

2 අනාරක්ෂිත ලිංගික වර්යාවන්හි යෙදී ඇති නම්, රුධිරය දුන් දීමෙන් වළකින්න



3. රුධිර පාරවිලයනය කළ යුතු අවස්ථා අඩු කර ගන්න

4. ඔබට රුධිරය පාරවිලයනය කරයි නම්, එය **HIV** ප්‍රතිදේහ සඳහා පරීක්ෂා කර ඇත් දැ යි තහවුරු කර ගැනීමට ඔබට අයිතියක් ඇත.



(3) ආසාදිත මව ගෙන් දරුවාට HIV ව්‍යාප්ත වීම වළක්වා ගැනීම



කාන්තාවන් **HIV** ආසාදනයෙන් වැළකී සිටීම

- ගර්භිණීභාවයට පත් වීමට පෙර **HIV** පරීක්ෂාවට ලක්වීම
- ගැබ් ගෙන සිටිය දී **HIV** පරීක්ෂාවට ලක්වීම අනිවාර්ය වේ
- ගැබ් ගෙන සිටිය දී **HIV** ආසාදිත බව දැන ගත් විට නොපමාව වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න.
- ගැබ්ණි කාලයේ දී ඖෂධ ලබාදීමෙන් හා වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමෙන් දරුවාට රෝගය වැළඳීමේ අවදානම අඩු වේ



(මෙම ඖෂධ රජයෙන් නොමිලේ සපයා දෙනු ලැබේ.)

සැලසුම් සහගත ගැබ් ගැනීම

- ආසාදිත කාන්තාවක් නම් සැලසුම් සහගත ගැබ් ගැනීමක් සඳහා අවශ්‍ය නිසි වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගත හැකිය.



**RESPECT
PROTECT**



කොන්ඩමය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ උපාංගයක්
නිසා එය ළඟ තබා ගැනීම නීතිය ඉදිරියේ
දඬුවම් ලැබිය යුතු වරදක් නොවන බව
සලකන්න

**National list of Essential Medicines Sri Lanka
2013-2014 , Ministry of Health, 5th Edition**

මගේ එකම බලාපොරොත්තුව නව කෙනෙකුට
HIV ආසාදනය නොවිය යුතු බවයි.



**“I LOVED AND LIVED WITH ONE MAN, NOW I
LIVE WITH HIV”**

Princy Mangalika

President - Positive Women's Network – Sri Lanka

The Changing Views : Patient Prognosis



2001, CD4 30, TB



2003, CD4 330




2005, CD4 670

with permission


HIV/AIDS situation of Sri Lanka

Estimated number of HIV infected people (year 2011)	3000
Adult HIV prevalence (> 15 years)	<0.1%
children < 15 years)	75
Male to Female ratio	1.6:1


Trend of newly Reported HIV cases




New HIV Cases by Sex as of end 2013 (N=1845)



Age and Sex of HIV Cases Reported during 1987-2013



Mode of transmission of HIV Cases reported up to end of 2013 N=1378 (In 427 (31%) cases mode of transmission is not reported)



THANK YOU!



**STOP
AIDS
GET TESTED**